

algaspring[®] PROTOCOLLO OLIVO



FASI FENOLOGICHE

AZIONI

	BBCH 01-09 Ripresa vegetativa	BBCH 51-59 Mignolatura	BBCH 71-75 Allegagione	BBCH 79 Ingrossamento frutti	BBCH 81-89 Invaatura Maturazione
STIMOLA L'ATTIVITÀ VEGETATIVA POST RIPOSO INVERNALE	RADIX 5-10 L/ha				
FAVORISCE UNA FIORITURA OMOGENEA MIGLIORA LA FERTILITÀ DEL POLLINE AUMENTA L'ALLEGAGIONE		FOLIAR 300 g/hl			
RIDUCE LA CASCOLA FISIOLOGICA MIGLIORA LA CRESCITA INIZIALE DEI FRUTTI SOSTIENE L'ATTIVITÀ FOTOSINTETICA			RADIX 5-10 L/ha FOLIAR 300 g/hl		
AIUTA L'INDURIMENTO DEL NOCCIOLO MIGLIORA LO SVILUPPO DEI FRUTTI				RADIX 5-10 L/ha FOLIAR 300 g/hl	
AUMENTA LA QUALITÀ DELL'OLIO (POLIFENOLI, RESA, AROMI) MIGLIORA LA RESISTENZA AGLI STRESS POST-RACCOLTA					RADIX 5-10 L/ha FOLIAR 300 g/hl

NOTE:

In caso di utilizzo in sinergia di RADIX e FOLIAR, distanziare i trattamenti con una pausa di 10 giorni.